


ACIL ÖNCEİ KULLANILAN İLAÇLAR



KULLANILACAK İLAÇLAR

ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR

* Adrenalin

* Dextroz % 5-10- 20

* Atropin

* Ringer Laktat

* Parasetamol

* %0.9 İzotonik
Çözeltisi

* İisordil 5 mg

* Asitil Salisilik Asit

* Etil Klorid Sprey

ONAYLI KULLANILACAK İLAÇLAR

ONAY ALINARAK KULLANILAN İLAÇLAR

% 2'lik Lidokain	*Antihistaminik	*Beta blokörler	*Diazepam	*Diltiazem
*Dopamin	*Midazolam	*Verapamil	*Amiadaron*	*Analjezik * (iv opiat)
*Naloksan	*Jetokain	*Aktif kömür	*Dobutamin*	*Kaptopril 25 mg
*Tüm sıvılar	*Magnezyum sülfat*	*Flumazenil	*Morfin	*Sodyum bicarbonat *(NaHCO3)*
*Pentothal 1gr amp.	*Kortikosteroid	*Antiemetik	*Salbutamol inhaler	*Furosemid
*Dimenhidrinad				

KULLANILMAYACAK İLAÇLAR!!!

*Aminokardol

*Spazmolitik

*Kalsiyum amp.

*Prilocain (citanes)
flk.

*Nitroderm TTS

**ONAYSIZ
KULLANILACAK
İLAÇLAR**

ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR



ADRENALİN

- * Periferde vasokonstriktör santralde vasodilatördür.
- * Kardiyak arrestin her aşamasında endikedir
- * İnce VF'yi kaba VF'ye çevirir.
- * Yetişkin doz her 3-5 dkda 1 mg
pediyatrik doz 0,01mg/kg 1/10.000 bolus uygulanır.
- * Dezavantajı miyokardın o₂ gereksinimini artırır.

ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR

ATROPİN

- ✱ Vagal etkiyi deprese ederek SA düğümde hız artmasına ve AV düğümde iletinin hızlanmasını sağlar
- ✱ Yavaş kalbi hızlandırır.
- ✱ Morfin ve organafosfat intoksu sonucu oluşan bradikardileri düzeltmede kullanılır
- ✱ Yetişkin doz maks 3 mg pediyatrik doz 0,02mg/kg maks. 0,5 mg adolösansta 1 mg'dır




ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR

İSORDİL 5 MG DİLALTI

- ✦ Anjina pektoris ağrılarının tedavi ve önlenmesinde endikedir.
- ✦ MI tedavisinde MONA protokolünün N aşamasında yer alan nitrogliserin grubundadır.
- ✦ Ambulansta güvenli verilebilecek bir ilaçtır.
- ✦ Anjina pektoris esnasında 5 mg tb sublingual olarak kullanılır.



ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR



ASETİL SALİSİLİK ASİT

- * Analjezik, Antipretik ve antienflamatuardır
- * 75-325 mg dozlar arasında antiagregan özelliğe olup MI tedavi protokolleri arasında çok önemli yer tutar.
- * 300 mg üzerindeki dozlarda analjezik özelliği başlar
- * Ticari isimleri: Ecopirin 100-150-300 mg tb Coraspin tb...

ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR



PARASETAMOL

- ✳ Analjezik antipiretik özelliktedir
- ✳ Hafif ve orta şiddetli ağrılarda ve ağrıya eşlik eden ateşin düşürülmesinde kullanılır.
- ✳ Ticari şekilleri: Parol 500 mg tb, Minoset 150 mg şrp, Minoset 500 mg tablet

ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR

ETİL KLORİD SPREY

- ✱ Lokal soğutucu özelliği ile travmaya bağlı ağrıları dindirmede kullanılır.
- ✱ Spor yaralanmalarında endikedir.
- ✱ Haricen kullanılır.
- ✱ Açık yara ve mukozaya kullanılmamalıdır.
- ✱ Yüksek derecede alev alıcıdır sigara içerken kullanılmamalıdır.

ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR

RİNGER LAKTAT

- * CPR Esnasında tercih sıvıdır.
- * Metabolik asidozda. Diyabet ketozu. Çocuk diyareleri. Ağır enfeksiyon hastalıkları. Hafif böbrek yetmezliğinde
- * Sıvı kayıpları ve hiponatremi durumlarında
 - * İzotonik sodyum azalmasının karşılanmasında
 - * Ekstraselüler sıvı hacminin düzeltilmesinde, organizmadaki sıvı ve elektrolit ihtiyaçlarının karşılanmasında endikedir.

ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR

%0.9 İZOTONİK SOLÜSYONU

- ✱ Extrasellüler sıvıyla aynı yoğunluğa sahiptir.
- ✱ Sıvı kayıplarında, asit-baz dengesizliğinde, diyabetik ketoasidozda, şok ve kanamalarda endikedir.
- ✱ KKKY, HT , ödemli hastalarda, su zehirlenmelerinde kontrendikedir.

ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR

DEXTROZ % 5-10-20

- * Hipertoniktir. Genellikle %5'lik solüsyon kullanılır.
- * Sıvı kayıplarında, asid-baz deng. hipoglisemide, alkolizmde, vücuttan sıvı atılmasını arttırmak için verilir.
- * Beyin kanamalarında ve şüphelenildiği durumlarda kullanılmaz.

ONAY
İSTENİLECEK
İLAÇLAR

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

LİDOKAİN



- * Antiaritmal ve lokal anestezik etkidir.
- * Şoka dirençli VF/ nabızsız VT de, açık kalp ameliyatlarında, digital zeh. AMI'da kullanılır.
- * İdame dozu: 1-1.5 mg/kg kullanılır. Maximum toplam doz 3mg/kg geçmemelidir.
- * Karaciğerden geçişi esnasında önemli ölçüde metebolize edilir.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

ANTIİHİSTAMİNİKLER

- ✱ Histaminin etkisini önleyen antiallerjik etkili ilaçlardır.
- ✱ En sık kullanılanıldıkları hastalık rinittir.
- ✱ Ortaya çıkardığı en sıkıcı etki uyku hali vermeleridir.
- ✱ Ticari ismi: Avil tb. krem, amp. ve Cetryn tb. vb. vardır.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

BETA BLOKÖRLER

- ✱ Sempatik sinir sisteminin etkilerini bloke ederek kalbin iş yükünü azaltan ilaçlardır.
- ✱ Hipertansiyonda, angina, kalp krizi, KY, hipertroidizm, glokom, anksiyete ve panik atak tedavisinde kullanılır.
- ✱ Bradikardi, kalp bloğu, KOAH, böbrek, karaciğer ve periferik damar hastalıkları, diyabette dikkatli kullanılmalıdır.
- ✱ Propranolol(DİDERAL) en çok kullanılan beta blokördür.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

DİAZEPAM



- ✳ Sedatif etkilidir.
- ✳ Epileptik nöbetlerde, özel durumlarda anksiyete ve kardioversiyon öncesi sedasyon sağlamak için kullanılır.
- ✳ Hamilelikte, alkol ve sedatif ilaç almışlarda, solunum deprese olan hastalarda, hipotansiyonu olanlarda kullanılmaz.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

DİAZEPAM

- ✱ 5 mg/1 ml ve 10 mg/2 ml ampulleri vardır . Başka ilaçlarla karıştırılmadan verilmelidir.
- ✱ Çocuklarda rektal yoldan 0.5 mg/kg olacak şekilde verilmelidir.
- ✱ Alanda şiddetli anksiyetesi olan hastaya 2-5 mg IM yapılabilir.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

DİLTİZEM

- ✳ Kalsiyum kanal blokörüdür. Antiaritmik ve antiiskemik etkilidir.
- ✳ İletim hızını yavaşlattığı gibi koroner vazodilatasyon yapıcı etkileri vardır.
- ✳ Kalp bloğu ve kalp yetmezliğinde kullanılması kontrendikedir.
- ✳ HT, taşiaritmi ve angina pectoris tedavisinde kullanılır.
- ✳ SVT'de önerilen doz 0.25 mg/kg 'dır.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

DOPAMİN

- * Kardiyotonik etkilidir.
- * Akut KKY, şok olgularında, böbrek yetmezliğinde , akut zehirlenmelerde, diüretik tedavisinin etkisini artırmak ve desteklemekte endikedir.
- * Bronşial astımda, taşiaritmilerde, böbrek üstü bezi tümörlerinde kontrendikedir.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

DOPAMİN

- * Çocuklarda ve yaşlılarda kullanılmaz.
- * Ağır hastalarda 5mcg/kg/dk hızla başlanır ve 5-10mcg/kg/dk artışlarla 20-50mcg/kg/dk'ya çıkarılmalıdır.
- * Yan etki olarak sol ventrikül diastolünde istenmeyen bir yükselme olabilir.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

MIDAZOLAM (DORMİCUM)

- ✱ Anestezi öncesi premedikasyon olarak ve yoğun bakım ünitelerinden uzun süreli sedasyon sağlamak amacıyla kullanılır.
- ✱ Çocuklarda anestezi endüksiyonu için dormicum önerilmez.
- ✱ Erişkinlerde klasik doz 2-3 mg'dır.
- ✱ Dormicumdan sonra ajitasyon, istemsiz hareketler, öfke reaksiyonu saldırganlık gibi reaksiyonlar bildirilmiştir.



ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

VERAPAMİL

- ✳️ Kalsiyum kanal blokörüdür. AV iletimi deprese eder. SVT tedavisinde endikedir.
- ✳️ Beta blokörle tedavi edilmemiş hastalara verapamil verilmez hipotansiyon ve asistoli riski vardır.
- ✳️ Kc yet. Beta blokör kullananlarda, çocuklarda, 1.derece AV blokta dikkatli kullanılmalıdır.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

VERAPAMİL

- * AV blokta, bradikardi de, kardiojenik şokta, HT, sinoatrial blokta kontrendikedir.
- * SV Aritmi de 5-10mg, proksimal taşikardide gerekirse 5-10dk sonra 5mg kullanılır
- * Ticari ismi: İsoptin, Tarka, Ormil, Fibrocard

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

NALOKSAN

- * Narkotiklerin aşırı doz alınımında kullanılan antidottur.
- * İV yoldan 0,8mg naloksan % 5 dextrozla 10 ml tamamlanır. Toplam doz 2,4 mg'dır.
- * Narkotik zehirlenmesi sonucu görülen stuporun , komanın, solunum baskılanmasının düzenlenmesini sağlar.
- * Eroin, morfin, kodein, vb. ilaçların etkisini tersine çevirir.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

AMIADARON (CORDARONE)

- * VF/ nabızsız VT, AF ve Atrial flutter, stabil dar kompleksli taşikardiler, stabil monomorfik VT'de endikedir.
- * 2. ve 3. derece kalp bloğunda, dolaşım kollapsında, arteriyel hipotansiyonda, hipertroidizmde, bradikardi nedenli senkoplarda kontrendikedir.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

AMIADARON (CORDARONE)

KARDİYAK ARREST DOZU

*300 mg IV puşe
(20-30 mL D5W'le dilüe)

*Dirençliyse 150 mg IV tekrar

*İnfüzyon 1 mg/dak ilk 6
saatte

*Ardından 0.5 mg/dk iv.

*Ardından 0.5 mg/dk iv.

ARİTMİ DOZU

*150 mg iv 10 dk. içinde

*1 mg/dk infüzyon ilk 6
saatte

*Gerekirse 150 mg IV
puşe tekrarlanabilir

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

ANALJEZİKLER

- * Analjezik; ağrı kesmek için kullanılan her türlü ilaca denir.
- * Analjezikler narkotikler ve narkotik olmayanlar olmak üzere 2'ye ayrılırlar.
- * Narkotikler: morfin, dolantin, kodein, vb.
- * Narkotik olmayanlar ise: salisilatlar, parasetamol, ibuprofen vb.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

JETOKAİN

- * Lokal anestezi etkili bir ilaçtır.
- * Diş hekimliğinde, sinir bloğu anesteziinde endikedir.
- * Amid türü lokal anesteziiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda, karaciğer rahatsızlığı olan kişilerde, diyabetlilerde, kardiyovasküler bozukluğu olanlarda kontrendikedir.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

AKTİF KÖMÜR

- ✳ İlaç ve kıymasallar ile olan zehirlenmelerin acil tedavisinde alınan maddenin gisten absorpsiyonunu azaltmak için kullanılır.
- ✳ **Yetişkin dozu:** 1gr/kg dozda ağızdan yada nazogastrik sonda ile verilir. İdame olarak 0.5mg/kg her 4 saatte tekrarlanabilir. max:100g aşılmamalıdır.
- ✳ **Çocuk dozu :** 1-2mg/kg 30 gr maximum doz dur. Daha sonra her 4 saatte 0.5mg/kg tekrarlanabilir.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

AKTİF KÖMÜR

- ✳ AK'ün adsorbe edebileceği madde alımı, solunum güvenliği olan hastada bilinmeyen madde alımında endikedir.
- ✳ Aktif karbon veya bilesimindeki maddelere karşı alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.
- ✳ Her toksik madde için aynı derecede etkili bir adsorban olmayabilir.
- ✳ Demir tuzları, siyanurler, lityum, borik asit, arsenik, etanol, metanol, etilen glikol, izopropanol gibi organik çözücüler üzerinde etkisi düşüktür.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

DOBUTAMİN

- * Akut KKY, şok olgularında, A.pankreatitde, böbrek yetmz. kronik kalp ve böbrek hastalığında düretik etkisini artırmada, epidural anesteziye, antiaritmial ve barbiturat vb.gibi ilaçlarla olan akut zehirlenmede endikedir.
- * Bronşiyal astımda, böbrek üstü bezi tümörlerinde (feokramasitoma), dar açılı glokomda, taşiaritmide ritim bozukluğunda kontrendikedir.
- * Doz aralığı, dakikada 25-10 mcg/kg/ml olacak şekildedir.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

KAPTORİL 25 mg

- * Güçlü bir ACE (Angiotensin-converting enzim) inhibitörüdür.
- * Hipertansiyonda, kalp yetmezliğinde kullanılır.
- * Tedaviye 2-3 defa 25 mg kaptorille başlanılır. 2 haftada cvp alınmazsa doz günde 3defa 50 mg çıkarılmalıdır.
- * Max. Doz 450 mg aşmamalıdır.
- * Böbrek yetmezliği olanlarda, etken maddeye aşırı duyarlı olanlarda, gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.



Biliyorum uykunuz geldi ama
az kaldı☺

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

MAGNEZYUM SÜLFAT(MgSO)

- * Magnezyum sülfat, çizgili kaslardaki kasılmayı azaltır ve asetilkolinin myoneural kavşaktan salınımını azaltarak periferik nöromuskular geçişi engeller.
- * Kalp bloğu ve myocard hasarında kontrendikedir.
- * Eklemsi nöbetlerinde,
Torsades de pointes'i gibi polimomorfik VT
Hipomagnezemi,
Refractory ventriküler fibrilasyon da endikedir.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

MAGNEZYUM SÜLFAT

✱ Ciddi magnezyum eksikliği kardiyak aritmilere neden olur:

Dirençli VF, Ani kardiyak ölüm

✱ Bilinen hipomagnezemik durumun olduğu inatçı veya tekrarlayan VF / nabızsız VT

- 2 g, 10 mL dex.ile dilüe, 1-2 dakika puşe

✱ QT intervalinin uzadığı polimomorfik VT

- Yükleme dozu - 2 g, 50-100 mL dex.ile dilüe, 5-60 dakika infüzyon
- Takiben, 0.5-1 g/st İV (torsadı kontrol ederek doza devam et)

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

FLUMAZENİL

- ✱ Benzodiazepinlerin merkezi sedatif etkilerinin tamamen veya kısmen tersine çevrilmesinde endikedir.
- ✱ KİBAS yada status epilepticus gibi hayatı tehdit edici durumların kontrolü için benzodiazepin verilmiş olan hastalarda kontrendikedir.
- ✱ Maksimum total doz 0.05 mg/kg veya 1 mg kadar 60 saniyelik aralarla(maksimum 4 kez) tekrarlanabilir.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

MORFİN

- * Güçlü bir analjezik etkiye sahiptir.
- * Vazodilatasyonla periferdeki kanlanmayı artırır kalbe geri dönüşü azaltır.
- * Myocardın O₂ gereksinimini azaltır.
- * Pulmoner ödemi periferde göllenmeyi sağlayarak azaltır.
- * Morfin 10-20 mg / 1 ml, içeren enjeksiyonluk solüsyonlar halindedir. SC veya IM uygulanabilir.

NOT: Alanda 15 mg aşılmamalıdır.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

MORFİN

- ✱ Alanda verilmesi önerilen doz: sulandırılmış olan 10 ml'lik morfinden ilk önce 4 ml IV olarak çok yavaş verilir.
- ✱ Ağrı geçmediyse, durumuna göre 15 dakika ara ile 3 ml olacak şekilde tekrarlanabilir
- ✱ Hipotansiyon gelişirse hastayı düz yatırın ve ilacı kesin.
- ✱ Bradikardi veya solunum arrestine karşı elinizin altında atropin ve nalokson hazır bulundurun.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

MORFİN

- * Kardiyojenik (konjestif kalp yetmezliğine eşlik eden) Pulmoner ödem, AMI, yanık ve diğer şiddetli ağrılar
- * Astım, KOAH, hipotansiyon, solunum depresyonu, kafa travmaları, AMI, tanı konulmamış abdominal ağrılar, alkol ve barbiturat benzeri ilaç alınımında kontrendikedir.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

SODYUM BİCARBONAT(NaHCO_3)

- ✱ Asidozu gidermek için kullanılır.
- ✱ Çok uzamış cpr'a cevap yoksa ve hiperpotasemide kullanılır.
- ✱ Metabolik alkoloz ve respiratuar alkolozda kullanılır.
- ✱ 1 mEq/kg IV olarak kullanılır.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

PENTOTHAL SODYUM 1gr

- ✱ Kısa süreli operasyonlarda, bölgesel anestezinin tamamlanmasında, analjezi ve kas gevşemesi için psikiatrik rahatsızlıklarda, konvülsif durumlarının kontrol altına alınmasında endikedir.
- ✱ Ciddi kardiovasküler rahatsızlık, hipotansiyon yada şok, addison hast. Şiddetli anemi vb. durumlarda kontrendikedir.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

KORTİKOSTEROİD

- * Astımın en etkili ilacı steroidlerdir.
 - * Mukus salgılanmasını azaltarak hava yollarında mukus birikimini önler.
 - * Kronik astım tedavisinde endikedirler.
 - * Kronik Astım Tedavisi
- Ağırlık derecesine göre günlük 7.5-60 mg prednizolon eşdeğeri dozlar tercih edilir.
- * Ağırlık derecesine göre 0.25-2 mg/kg tek dozda verilir.(çocuklarda)

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

SALBUTAMOL İNH.(VENTOLİN)

- * Bronşları genişletir.
- * Astım ve Kronik obstruktif akciğer hastalığına bağlı bronkospazmlarda endikedir.
- * Semptomatik taşikardi ve ilaca karşı bilinen alerjik reaksiyonlarda kontrendikedir.
- * **DİKKAT:** Kan basıncı, nabız, EKG düzenli izlenmelidir. Kalp hastalığı olan kişilerde daha dikkatli kullanılmalıdır.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

ANTIEMETİKLER

- * Bulantı ve kusma semptomunun giderilmesinde kullanılan ilaçlara denir.
- * Akut kusmalarda oral yol kullanılmaz.
- * Antiemetik olarak kullanılan ilaçlar:
 - a) Skopolamin (Hiyosin)
 - b) Antihistaminikler (Dimenhidrinat)
 - c) Nöroleptikler (Klorpromazin)
 - d) Metoklopramid (Metpamid)
 - e) Trimetobenzamid (Emadur)

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

FUROSEMİD

- ✱ Kıvrım diüretiği grubuna dahil bir idrar söktürücüdür. Etkisi henle kıvrımı üzerindedir.
- ✱ Furasemid, böbrek damarlarını genişletir, böbrek kan akımını artırır ve filtrasyon hızlandırır.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

FUROSEMİD

- ✱ Gut, diyabet, prostat hipertrofisinde kullanılması kontrendikedir.
- ✱ Sol kalp yetmezliği ve akciğer ödemi tedavisinde kullanılmaktadır.
- ✱ Günde 20-250mg, zorlu diürez amacıyla 0.5-2g dozunda kullanılır.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

DİMENHİDRİNAT

- ✱ Taşıt tutmasına karşı en etkili antihistaminik ilaçtır. Antiemetik ilaçlardan antihistaminikler gurubuna girer.
- ✱ Deniz tutması, uçak tutması, tren, otomobil ve otobüs tutması, Meniere sendromunda endikedir.

ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

DİMENHİDRİNAT

- ✱ Refleks azalması ve uyuşukluk nedeniyle motorlu taşıt kullanma esnasında, epilepside ve yenidoğanda kontrendikedir.
- ✱ Başlangıçta 50-100mg dozunda kullanılır. (oral yada parenteral)
- ✱ Günlük yetişkin toplam dozu 400mg'dır

ONAY
İSTENİLECEK
SIVILAR

ONAY İSTEYECEK SIVILAR

ISOLYTE (%5 DEXTROZLU)

- * Bebek ve küçük çocuklarda su ve elektrolit dengesinin boz. , böbreklerin idrarı idrarı konsantre edebilme yeteneğinin zayıfladığı durumlar, aşırı su kaybı, hafif metabolik asidozda endikedir.
- * Ağır böbrek hastalığı, sürrenal yetmezliği ve hipoparaitiroidizm, diyabetes insipitus, hipopotasemi, sulfitlere duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

ONAY İSTEYECEK SIVILAR

TEOBAG 200

(200mg Teofilin +%5 Dextroz Çözeltisi)

- * Astım belirtilerinin tedavisi ve önlenmesinde, kronik bronşit ve anfizemde görülen reverzibi bronkospazm belirtilerinin tedavi ve önlenmesinde endikedir.
- * Teobag 200 bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı olanlara karşı kontrendikedir.

ONAY İSTEYECEK SIVILAR

PROCALAMİNE

(%3 Amino Asit ve %3 Gliserin Sodyumu)

- * Kısa bir süre için paranteral beslenmeye ihtiyacı olan erişkin hastalarda vücuda proteinlerin karışması ve azot dengesinin düzeltilmesi amacıyla periferik yoldan uygulanır.
- * Böbrek yetmezliği, ileri derece de karaciğer hastalığı ve karaciğer koması, azalmış azot ütilizasyonu ile birlikte seyreden hastalıklar, bir veya daha fazla amino aside karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.

ONAY İSTEYECEK SIVILAR

RHEOMACRODEX

- * Kapiller dolaşımın yavaşladığı durumlar (şok, yanık)
- * Arter ve ven dolaşım bozuklukları (gangren tehdidi)
- * Ameliyat ve travma sonrası damar ve plastik cerrahi sırasında görülebilecek tromboembolik olayın profilaksisinde endikedir.

ONAY İSTEYECEK SIVILAR

MACRODEX SOLÜSYONU

- ✱ Dolaşan kan hacminin azalmış bulunduğu kanama, travma, yanık, ameliyata bağlı şokların tedavisinde endikedir.
- ✱ Dextrana aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir

ONAY İSTEYECEK SIVILAR

İZOLEX SOLÜSYONU

- ✱ Ağızdan besin alamayan ameliyatlı hastalarda
 - a) Dehidratasyonun önlenmesi ve tedavisi ile elektrolit dengesizliğinin düzeltilmesi için
 - b) Hipopotaseminin düzeltilmesi için
 - c) Asidoz tedavisi için kullanılır.
- ✱ Anüri, böbrek yet. Crush send. hemodiyaliz, kalp bloğu plazmadaki potasyum yüksek olduğunda ve alkolozda kontrendikedir.

ONAY İSTEYECEK SIVILAR

İZOLEN SOLÜSYONU

- * Ağız yoluyla su alamayanlarda, hafif metabolik asidozda, muhtelif dehidratasyonda, su ve elektrolit alamayan ve kaybeden kişilerde endikedir.
- * Sürrenal korteks yet. Kalp bloğunda, böbrek yet. Crush send. Ağır hemolizde ve anüride kontrendikedir.

ONAY İSTEYECEK SIVILAR

MANNİTOL SOLÜSYONU

- * Kafa içi basıncını ve kitlesinin azaltılması, artmış göz içi basıncının azaltılması, idrar çıkışının artırılması, iskemi sonucu oluşan oligürinin önlenmesinde endikedir.
- * Anüri, aktif kafa içi kanaması, sıvı elektrolit azlığı, kalp yet. durumlarında kontrendikedir.

**KULLANILMAYACAK
İLAÇLAR**

KULLANILMYACAK İLAÇLAR

AMİNACADOL amp.

- * Bronşiyal astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm, sol ventrikül yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem ve paroksizmal noktürnal dispnenin tedavisinde endikedir.
- * Aktif peptik ülser ve aktif gastritli hastalarda kullanılmamalıdır

KULLANILMYACAK İLAÇLAR

AMİNACADOL amp.

- * Akut olgularda 1 ampul i.v. olarak yavaş şekilde (5 dakika) zerkedilir. Tercihen ilaç %5'lik 10-20 ml dekstroz veya %5'lik 100-200 ml glikoz veya serum fizyolojik ile sulandırılıp uygulanır.
- * yükleme dozu yetişkinler ve çocuklar için 6 mg/kg'dır. İdame tedavisi olarak enfüzyonlar tekrar edilir, 8-12 saatte bir, 4 mg/kg veya 8 mg/kg ampul uygulanır.

KULLANILMYACAK İLAÇLAR

CALCIUM Ampul

* Değişik kaynaklı osteoporozlarda, raşitizm ve osteomalazi tedavisine ek olarak, gizli tetani , alerjik durumlarda, kadınların gebelik ve emzirme dönemleriyle çocukların büyüme ve gelişme devrelerinde artan kalsiyum gereksiniminin karşılanmasında endikedir.

KULLANILMAYACAK İLAÇLAR

CALCIUM Ampul

- * İlacı aşırı duyarlılık, hiperkalsemi , şiddetli hiperkalsiüri, ağır renal yetmezlik durumlarında kontrendikedir
- * Günlük doz erişkinlerde 1 ampul ve çocuklarda 1/4-1/2 ampuldür. I.M. ya I.V. uygulanır.

KULLANILMYACAK İLAÇLAR

CITANEST

- * Lokal infiltrasyon, küçük ve büyük sinir blokları, epidural blok ve artroskopi dahil çeşitli anestezi yöntemlerinde kullanılabilir.
- * Intravenöz bölgesel anestezide ilk ilaç olarak prilokainin tercih edilmesi önerilmektedir.

KULLANILMYACAK İLAÇLAR

CITANEST (PRILOCAİN)

- * Amid grubu lokal anesteziyelere ya da bileşiminde bulunan diğer maddelere aşırıduyarlı olan hastalarda,
- * Konjenital ya da idiyopatik methemoglobinemili hastalarda kullanılmamalıdır.

KULLANILMYACAK İLAÇLAR

NİTRODERM

- * Anjina pektorisin uzun süreli tedavisi ve önlenmesi, kardiyak glikozidler, diüretikler, ADE inhibitörleri ya da arteriyel vazodilatörlerle bir arada ağır kronik Miyokart yetersizliğin uzun süreli tedavisi, pulmoner hipertansiyonda endikedir.
- * Akut dolaşım yet. Kalp şoku, şiddetli hipotansiyonda kontrendikedir.

KULLANILMYACAK İLAÇLAR

SPAZMOLİTİKLER

- * Spazmolitik ilaçlar spazm çözücü özelliğe sahiptir.
- * Gastrointestinal spazmlar, mide veya duodenum ülserleri, kolon spazmları, spastik kabızlık ve kolitler, safra kesesi spazmları ve safra taşlarından kaynaklanan ağrılar, dismenore, uterus spazmları ve doğum esnasındaki yumuşak doku spazmlarında endikedir.

KULLANILMYACAK İLAÇLAR

SPAZMOLİTİKLER

*Glokom, prostat hipertrofisine bağlı idrar retansiyonu, gastrointestinal sistemin mekanik stenozları, megakolon, myasthenia gravis ve taşikardi varlığında kullanılmamalıdır.

*Ticari ismi: Buscopan

HADI BAKALIM
BIRAZ DA SORU
ÇÖZELİMMM



AŐAĖIDAKİ İLAÇLARDAN
HANGİSİ CPR'DA
KULLANILMAZ?

- A. ADRENALİN
- B. ATROPİN
- C. NALOKSAN
- D. LİDOKAİN

C.

NALOKSAN

AŐAĖİDAKI İLAÇLARDAN
HANGİSİ ONAYSIZ
KULLANILACAK İLAÇLAR
ARASINDA YER ALIR?

A. KAPTORİL 25 mg

B. İSORDİL 5 mg

C. VERAPAMİL

D. DİLTİAZEM

B. ISORDIL 5 mg

Aşağıdaki ilaçlardan
hangisinin kullanımı
yasaktır?

- A.** Dimenhidrinad
- B.** Spazmolitik
- C.** Antiemetik
- D.** Flumazenil

B.

SPAZMOLİTİKLER



Baby's first Christmas

TEŞEKKÜRLER...

